

**ABSTRAK**  
**HUBUNGAN INTERPERSONAL *INFLUENCE* DENGAN DENGAN**  
**KUALITAS HIDUP PADA PENDERITA TB PARU DI PUSKESMAS**  
**SARONGGI KABUPATEN SUMENEP**

**Oleh : Sasmiyati**

Kualitas hidup penderita TB Paru sangat penting diperhatikan karena penyakit infeksi bersifat kronis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Untuk meningkatkan kualitas hidup adalah dengan memberikan dukungan keluarga, sosial dan tenaga kesehatan kepada penderita TB Paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *Interpersonal Influence* (Dukungan Keluarga, dukungan Sosial dan Tenaga Kesehatan) dengan Kualitas hidup pada Penderita TB Paru di Puskesmas Saronggi Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah para penderita TB Paru. Teknik sampling menggunakan *simple random sampling* sehingga sampel berjumlah 40 responden. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tentang hubungan *Interpersonal Influence* (Dukungan Keluarga, dukungan Sosial dan Tenaga Kesehatan) dengan Kualitas hidup TB Paru. Analisa data menggunakan uji korelasi spearman dengan ( $\alpha < 0,05$ ).

Hasil penelitian menunjukkan, sebagian besar penderita TB Paru memiliki *Interpersonal Influence* (Dukungan keluarga, dukungan sosial dan tenaga kesehatan) yang tinggi, hampir setengahnya penderita TB Paru memiliki kualitas hidup yang cukup. Hasil analisis data tentang hubungan *Interpersonal Influence* (Dukungan keluarga, dukungan sosial dan tenaga kesehatan) dengan kualitas hidup pada penderita TB Paru didapatkan  $\rho$ Value = dukungan keluarga ( $< 0,001$ ), dukungan sosial (  $0,002$  ) dan tenaga kesehatan( $0,004$ )  $\alpha < 0,05$ ) sehingga ada hubungan *Interpersonal Influence* (Dukungan keluarga, dukungan sosial dan tenaga kesehatan) dengan kualitas hidup penderita TB Paru.

Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi dan informasi tentang penyakit TB kepada masyarakat dan para keluarga diharapkan untuk selalu memantau penderita TB Paru untuk melakukan pengobatan TB sampai selesai

**Kata Kunci : Dukungan Keluarga, dukungan sosial, Tenaga Kesehatan, Kualitas Hidup TB Paru**

## **ABSTRACT**

### **RELATIONSHIP OF INTERPERSONAL INFLUENCE WITH QUALITY OF LIFE IN PULMONARY TB PATIENTS IN PUSKESMAS SARONGGI SUMENEP REGENCY**

**By: Sasmiyati**

*Quality of life It is very important to pay attention to the quality of life of people with pulmonary TB because infectious diseases are chronic which can affect the quality of life. To improve the quality of life is to provide family, social and health support to people with pulmonary TB. This study aims to determine the relationship of Interpersonal Influence (Family Support, Social Support and Health Workers) with Quality of Life in Pulmonary TB Patients at the Saronggi Health Center, Sumenep Regency.*

*This research is a quantitative research using cross-sectional research. The population in this study were patients with pulmonary TB. The sampling technique used simple random sampling so that the sample amounted to 40 respondents. Data were collected using a questionnaire about the relationship of Interpersonal Influence (Family Support, Social Support and Health Workers) with Quality of Life for Pulmonary TB. Data analysis using Spearman correlation test with ( $< 0.05$ ).*

*The results showed that most of the pulmonary TB patients had a strong Interpersonal Influence (family support, social support and health workers), almost half of them had a sufficient quality of life. The results of data analysis on the relationship of Interpersonal Influence (family support, social support and health workers) with quality of life in patients with pulmonary TB obtained  $p$  Value = family support ( $< 0.001$ ), social support ( $0.002$ ) and health workers ( $0.004 < 0.05$ ) so that there is a relationship between Interpersonal Influence (family support, social support and health workers) with the quality of life of people with pulmonary TB.*

*Health workers can provide education and information about TB disease to the community and families are expected to always monitor pulmonary TB patients to carry out TB treatment until complete*

**Keywords: Family support, social support, health workers, Quality of Life for Pulmonary TB**