

ABSTRAK

HUBUNGAN POLA ASUH DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI PUSKESMAS GAPURA

Oleh: Fatimah

Stunting didefinisikan sebagai keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek yang didasarkan dengan ambang batas (*z-score*) antara -3 SD sampai dengan < -2 SD. Faktor pola asuh yang tidak baik dalam keluarga merupakan salah satu penyebab timbulnya permasalahan gizi (stunting). Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pola asuh dengan kejadian stunting pada balita di Puskesmas Gapura. Metode penelitian kuantitatif pendekatan case control, populasi kasus 70 orang dan kontrol 724, sampel 19 orang pada kelompok kasus dan kontrol, teknik sampling *simple random sampling*, *variable independen* pola asuh, *variabel dependen* kejadian stunting, tempat penelitian Puskesmas Gapura, instrument penelitian menggunakan kuesioner dan melihat buku KIA tentang TB atau PB anak sesuai umur, analisa data menggunakan *Chi square* dan *OR*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden pada kelompok kontrol memiliki pola asuh baik 16 (84,2%) dan kelompok kasus sebagian besar memiliki pola asuh buruk 13 (63,2%). Kelompok kasus seluruhnya adalah stunting 19 (100%) dan kelompok kontrol seluruhnya adalah tidak stunting 19 (100%). Ada hubungan pola asuh dengan kejadian stunting *p value* $0,003 < 0,05$ dan *OR* sebesar 9,143. Bidan mempromosikan tentang pemenuhan status gizi anak melalui pola asuh yang baik orang tua terhadap anak. Pola asuh orang tua terkait stunting dapat berupa kegiatan pemberian makan meliputi frekuensi pemberian makan, pertimbangan pemilihan jenis, penentuan waktu, dan cara pemberian makan.

Kata kunci: *Pola asuh, Stunting, balita*

ABSTRACT

RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING PATTERN AND STUNTING INCIDENCE IN TODDLERS AT HEALTH CARE CENTER OF GAPURA

By: Fatimah

Stunting is defined as a short or very short body condition based on a threshold (z-score) between -3 SD to < -2 SD. Poor parenting in the family is one of the causes of nutritional problems (stunting). The aim of the study was to determine the relationship between parenting style and the incidence of stunting in toddlers at the Gapura Health Center. Quantitative research method case control approach, population of 70 cases and 724 controls, sample of 19 people in the case and control groups, simple random sampling technique, parenting pattern independent variable, dependent variable stunting incidence, Gapura Health Center research site, research instrument using a questionnaire and see the MCH book about TB or PB of children according to age, data analysis using Chi square and OR. The results showed that almost all respondents in the control group had good parenting 16 (84.2%) and the case group mostly had bad parenting 13 (63.2%). The total case group was 19 (100%) stunted and the control group was 19 (100%) non-stunted. There is a relationship between parenting style and the incidence of stunting with a p value of 0.003 <0.05 and an OR of 9.143. Midwives promote the fulfillment of children's nutritional status through good parenting parents to children. Parenting patterns related to stunting can be in the form of feeding activities including the frequency of feeding, consideration of species selection, timing and method of feeding.

Keywords: *Parenting, Stunting, toddler*

