

ABSTRAK

HUBUNGAN POLA PEMBERIAN MP-ASI DAN POLA ASUH DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA USIA 6-24 BULAN DI POLINDES TLONTORAJA WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASEAN

Sukainah¹ Ratna Indriyani² Syaifurrahman Hidayat³
Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Wiraraja Sumenep

Masih ada ibu yang memberikan MP-ASI dengan tidak tepat waktu, tidak bervariasi sehingga balita tidak mau makan serta pola asuh yang kurang baik dapat berdampak pada status gizi balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola pemberian MP-ASI dan pola asuh dengan status gizi pada balita usia 6-24 bulan di Polindes Tlontoraja Wilayah Kerja Puskesmas Pasean. Penelitian ini menggunakan desain analitik korelasional dengan pendekatan *cross-sectional*, jumlah populasi sebanyak 47 orang diperoleh sampel dengan teknik *simple random sampling* yaitu 42 orang menggunakan alat ukur kuesioner dengan analisa data *korelasi berganda*. Hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar pola pemberian MP-ASI dengan kategori baik sebanyak 24 orang (57,1%), hampir seluruhnya pola asuh dengan kategori baik sebanyak 33 orang (78,6%), setengahnya status gizi pada balita dengan kategori lebih sebanyak 21 orang (50,0%). Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji *korelasi berganda* didapatkan p value 0,000 (<0,05), artinya ada hubungan pola pemberian MP-ASI dan pola asuh dengan status gizi pada balita usia 6-24 bulan di Polindes Tlontoraja Wilayah Kerja Puskesmas Pasean Kabupaten Pamekasan. Ibu memiliki peran penting dalam status gizi balita, jika ibu memberikan MP-ASI dengan baik dan memiliki pola pengasuhan baik maka status gizi balita akan menjadi baik

Kata kunci: pola pemberian MP-ASI, pola asuh, status gizi balita

ABSTRACT
THE RELATIONSHIP BETWEEN PATTERN OF WEANING FOOD AND PARENTING PATTERNS WITH NUTRITIONAL STATUS IN TODDLERS AGED 6-24 MONTHS AT TLONTORAJA POLINDES, PASEAN PUBLIC HEALTH CENTER

Sukainah¹ Ratna Indriyani² Syaifurrahman Hidayat³
Midwifery Study Program, Wiraraja University, Sumenep

Several mothers still do not provide weaning food on time, do not vary so that toddlers do not want to eat and poor parenting patterns can have an impact on the nutritional status of toddlers. This study aimed to determine the relationship between complementary feeding patterns and parenting patterns with the nutritional status of toddlers aged 6-24 months at the Tlontoraja Polindes. Pasean Health Center. This study used a correlational analytic design with a cross-sectional approach, with a total population of 47 people. The sample was obtained using a simple random sampling technique, namely 42 people using a questionnaire measuring instrument with multiple correlation data analysis. The results of this study showed that most of the patterns of giving weaning food were in the good category as many as 24 people (57.1%), almost all parenting patterns were in the good category as many as 33 people (78.6%), half of the nutritional status in toddlers with more categories was 21 people (50.0%). Based on the results of the analysis using the multiple correlation test, it was obtained a p value of 0.000 (<0.05), meaning that there is a relationship between the pattern of complementary feeding and parenting with the nutritional status of toddlers aged 6-24 months at the Tlontoraja Polindes, Pasean Health Center, Pamekasan Regency. Mothers have an important role in the nutritional status of toddlers, if mothers provide MP-ASI well and have good parenting pattern, the nutritional status of toddlers will be good

Keywords: *pattern of complementary feeding, parenting style, nutritional status of toddlers*