

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU DALAM MEMBERIKAN MAKANAN TAMBAHAN PADA BAYI USIA DI BAWAH 6 BULAN DI PESISIR (KOMUNITAS NELAYAN) WILAYAH KERJA PUSKESMAS TALANGO

Oleh : Nanda Eka Siswandini

Makanan pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan pada bayi/ anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Makanan pendamping ASI diberikan mulai umur 6 bulan sampai 24 bulan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan resiko dalam pemberian MP ASI dini. Salah satu diantaranya yaitu faktor sikap, pekerjaan dan dukungan suami.

Desain penelitian ini adalah studi cross sectional. Populasinya seluruh ibu yang mempunyai bayi usia di bawah 6 bulan sebanyak 52 bayi. Sampel yang akan diambil dari populasi adalah 36 responden. Teknik sampling yang digunakan yaitu *simple random sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Hampir seluruh 16 (94,1%) dari responden sikapnya positif (mendukung) memberikan MP ASI dini di Wilayah Kerja Puskesmas Talango. Hampir seluruh 19 (86,4%) dari responden yang bekerja dan memberikan MP ASI dini di Wilayah Puskesmas Talango. Hampir seluruh 17 (89,5%) responden yang suaminya mendukung memberikan MP ASI dini di Wilayah Puskesmas Talango. Hasil uji *chi-square* diperoleh *p value* 0,000 ($p < \alpha = 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap, pekerjaan dan dukungan keluarga dengan pemberian makanan tambahan pada bayi usia di bawah 6 bulan di pesisir (komunitas nelayan) wilayah kerja Puskesmas Talango.

Kesimpulan: ada hubungan antara sikap, pekerjaan dan dukungan keluarga dengan pemberian makanan tambahan pada bayi usia di bawah 6 bulan di pesisir (komunitas nelayan) wilayah kerja Puskesmas Talango.

Kata kunci: Makanan pendamping ASI, sikap, pekerjaan dan dukungan keluarga

ABSTRACT

FACTORS THAT INFLUENCE MOTHERS IN GIVING ADDITIONAL FOODS TO BABIES UNDER 6 MONTHS OF COASTAL AGE (FISHERMAN COMMUNITY) REGION TALANGO PUSKESMAS WORK

By: Nanda Eka Siswandini

Complementary food for ASI is food or drink that contains nutrients given to infants/children to meet their nutritional needs. Complementary food is given from 6 months to 24 months of age. There are several factors that cause risks in early complementary breastfeeding. One of them is attitude, work and husband's support.

The research design is a cross sectional study. The population is all mothers who have babies under 6 months of age as many as 52 babies. The sample to be taken from the population is 36 respondents. The sampling technique used is simple random sampling. Data collection using a questionnaire.

The results showed that almost all 16 (94.1%) of the respondents had a positive (supportive) attitude in giving early MP ASI in the Talango Health Center Work Area. Almost all 19 (86.4%) of the respondents worked and provided early complementary breastfeeding in the Talango Health Center area. Almost all 17 (89.5%) respondents whose husbands support giving early complementary breastfeeding in the Talango Health Center area. The results of the chi-square test obtained a p value of 0.000 ($p < \alpha = 0.05$), this indicates that there is a relationship between attitudes, work and family support with the provision of supplementary food to infants under 6 months of age in the coastal (fishing community) area work of the Talango Health Center.

Conclusion: there is a relationship between attitude, work and family support with the provision of supplementary food to infants under 6 months of age in the coastal (fishing community) working area of the Talango Health Center.

Keywords: Complementary food, attitude, work and family support